Patient Information

ACE Inhibitors Tablet / Oral

(Drugs included in this class are: Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, Ramipril)

Indications:

ACE Inhibitors are a class of drugs used to treat the underlying cause of blood pressure and/or heart related disorders.

Directions for use:

- Take your medicine at the same time every day
- ACE Inhibitors are usually taken once a day, mostly at bed time
- Try to avoid unnecessary intake of potassium supplements while taking ACE Inhibitors
- Do not discontinue your medicine without consulting your doctor

Tell your doctor if you:

- Are allergic to ACE Inhibitors
- Take any other prescription or nonprescription medicine
- Have diabetes mellitus
- Have heart or blood vessel disease
- Have had a heart attack or a stroke
- Have kidney or liver disease
- Are pregnant, planning to become pregnant or breast-feeding

Common side effects:

Dizziness, headache, fatigue or dry cough

Consult your physician immediately if any of the following conditions occur:

- Sudden swelling of the face, mouth, tongue, lips, hands and feet
- Trouble in swallowing and breathing

What to do if a dose is missed:

- Take the missed dose as soon as you remember
- Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose
- Do not take extra medicine to make up for the missed dose

What to do if there is an overdose:

 Seek immediate emergency medical attention for any suspected overdose.

Storage:

- Store at room temperature away from light and moisture
- Keep all medicines away from children and pets
- Do not use medication beyond the expiry date mentioned on the pack
- Do not share your medicine with anyone

For more information, please contact:

Drug and Poison Information Centre, Department of Pharmacy Services, Aga Khan University Hospital, Karachi

P. O. Box 3500, Stadium Road, Karachi-74800, Pakistan,

Tel: +92 21 3486 1504/1506, Email: drug.information@aku.edu, Website: hospitals.aku.edu/karachi/dpic





مریفوں کے لیے دہنمادایات اسے سی ای انہمیبیٹر زگولیاں/ تشریت

(ادویات جواس کلاس میں شامل میں: کمپیٹو پرل، اینالا پرل، فوسینو پرل، لأسینو پرل، پیرنڈو پرل، ریمیپرل)

اے سی ای انہ ہیں ٹر زالیں ادویات ہیں جوخون کے دباؤیس کمی بیشی اور/یادل کے امراض کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔

دوائس طرح استعمال کی جائے؟

انتعمال

- اے بی ای انہبیٹر ز روزاندایک مقررہ وقت پرانتعمال کریں۔
- اےسی ابھی انہ بیبیٹر زعام طور پر دن میں ایک بارسوتے وقت استعمال کی جاتی ہیں۔ میں ۔
- ۔۔۔ اے سی ای انہبیٹر زکے استعمال کے دوران پوٹاشیم سمبینٹس کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں۔
- ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اے سی ای انہیبیٹر ز کا انتعمال ترک یہ کریں۔

دُاكِتْرُومُطلع كرين ا كر:

- آپکواسے مای انہ پیٹر زسے الرحی ہو۔
- آپ ننچ یا بغیر ننچ والی کو ئی د واانتعمال کررہے ہوں ۔
 - آپ کو ذیا میطس میلائٹس ہو۔
 - آپ کودل یا شریا نوں کا کو کی مرض ہو۔
 - آپ کو فالج یادل کادوره پڑچکا ہو۔
 - آپ کو گردول یا جگر کا کوئی مرض ہو۔
- آپ عاملہ ہوں ، حاملہ ہونے کااراد ہ کھتی ہوں یا بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔

عمومی منی اثرات

- سرچکرانا
- ٠ سرورد
- تھکن یا کھانسی

اگردرج ذیل میں سے و ئی علامت یائی جائے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں:

- · جېرے،منه،زبان، بهونٹول، ہاتھوں اورپیروں پرایا نک موجن
 - نگلنے اور سانس لینے میں مشکل

ا گردوا کی خوراک کھانا بھول جائیں تو:

- جیسے ہی یاد آئے دوا کھالیں ۔
- اگرانگی خوراک کاوقت ہوگیا ہے تو پیچیلی خوراک مذکھائیں۔
- پچیلی خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیےاضافی خوراک مذکھائیں۔

ا گراضا فی خوراک تھالیں تو:

فوراً طبی مدد حاصل کریں۔

دوا کی حفاظت:

- دواکوکمرے کے درجہ حرارت پر دھوپ اور نمی سے محفوظ رکھیں۔
 - تمام اد ویات بچول اور پالتو جانورول سے دوررکھیں۔
- اگر دُوا کے استعمال کی میعاد گزر چکی ہوتو اسے استعمال نہ کریں۔ بیر میعاد ڈ بے پر درج ہوتی ہے۔
 - اپنی دواکسی کوائتعمال کرنے کے لیے مذدیں

مزید معلومات کے لیے برائے مہریانی ورج ذیل پررابطہ کریں:

ڈرگ اینڈ پوائزن انفارمیشن سینٹر، ڈیپارٹمنٹ آف فارمیسی سروسز، آغاخان یو نیورٹی ہیپتال، کراچی

P. O. Box 3500, Stadium Road, Karachi-74800, Pakistan,

Tel: +92 21 3486 1504/1506, Email: drug.information@aku.edu, Website: hospitals.aku.edu/karachi/dpic



آغت خان يونيور شي تبيتال، راچي

The Aga Khan University Hospital, Karachi

