

## Patient Information

# Morphine Sulphate Capsule/Oral

### Indications:

Morphine Sulphate is used to relieve moderate to severe pain.

### Directions for use:

- Use morphine sulphate exactly as it is prescribed for you
- If your stomach is upset, take the medicine with food
- Do not chew or crush the capsule
- Do not discontinue taking morphine sulphate without consulting your doctor

### Tell your doctor if you:

- Are allergic to morphine sulphate
- Take any other prescription or non-prescription medicine
- Have breathing disorders
- Have liver or kidney disease
- Take alcohol
- Are pregnant, planning to become pregnant or breast feeding

### Common side effects:

- Nausea
- Constipation
- Shallow breathing
- Slow heartbeat
- Seizure
- Confusion
- Severe weakness or dizziness

### What to do if a dose is missed:

- Take the missed dose as soon as you remember

- Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose
- Do not take extra medicine to make-up for the missed dose

### What to do if there is an overdose:

- Seek immediate medical attention for any suspected over dosage
- Drink a glass of milk and call your doctor right away

### Overdose symptoms may include:

- Pinpoint pupils
- Severe constipation
- Severe nausea, vomiting
- Spasms of the stomach or intestinal tract
- Low blood pressure
- Weak pulse
- Drowsiness
- Coma
- Possible seizures
- Difficulty in breathing
- Fingernails and lips turning blue

### Storage:

- Store at room temperature away from light and moisture
- Keep all medicines away from children and pets
- Do not use medication beyond the expiry date mentioned on the pack
- If unused, return the drug to pharmacy for proper disposal
- Do not share your medicine with anyone

For more information, please contact:

**Drug and Poison Information Centre, Department of Pharmacy Services,  
Aga Khan University Hospital, Karachi**

P. O. Box 3500, Stadium Road, Karachi-74800, Pakistan,

Tel: +92 21 3486 1504/1506, Email: [drug.information@aku.edu](mailto:drug.information@aku.edu), Website: [hospitals.aku.edu/karachi/dpic](http://hospitals.aku.edu/karachi/dpic)



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi



مریضوں کے لیے رہنما ہدایات

## مورفین سلیفیٹ کپسول / شربت

• پچھلی خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اضافی خوراک نہ کھائیں۔

استعمال

مورفین اس وقت استعمال ہوتی ہے جب دیگر درد کش ادویات معتدل اور شدید درد کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائیں۔

• اگر اضافی خوراک کھالیں تو:

• فوراً طبی مدد حاصل کریں۔

• دودھ کا ایک گلاس پئیں اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

دوا کس طرح استعمال کی جائے؟

• مورفین بالکل اسی طرح استعمال کریں جس طرح ڈاکٹر نے تجویز کی ہے۔

• اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہو تو دوا کو کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔

• کپسول کو توڑنے یا چبانے سے گریز کریں۔

• ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مورفین سلیفیٹ کا استعمال ترک نہ کریں۔

• اضافی خوراک کھالینے کی علامات:

• پتلیوں کا سکڑ جانا

• قبض

• متلی

• معدے اور آنتوں کی اینٹھن

• قے

• خون کے دباؤ میں کمی

• نبض کا دھیمہ ہونا

• کومے میں چلا جانا

• سر چکرانا

• مرگی کے ممکنہ دورے

• سانس لینے میں تکلیف

• سانس کا آہستہ آنا یا کوشش کر کے سانس لینا

• سانس کا سینے کے اوپری حصے تک محدود رہنا

• ناخون اور ہونٹوں کا نیلا پڑ جانا

ڈاکٹر کو مطلع کریں اگر:

• آپ کو مورفین یا کسی اور دوا سے الرجی ہو۔

• آپ نسنے یا بغیر نسنے والی کوئی دوا استعمال کر رہے ہوں۔

• آپ کو سانس کے مسائل ہوں۔

• آپ کو جگر یا گردوں کا کوئی مرض ہو۔

• آپ شراب نوشی کرتے ہوں۔

• آپ حاملہ ہوں، حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں یا بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔

ضمنی اثرات

• متلی

• قبض

• سانس کا سینے کے اوپری حصے تک رہنا

• دھڑکن کا سست ہونا

• مرگی کے دورے

• بدحواسی

• شدید کمزوری یا سر چکرانا

دوا کی حفاظت:

• دوا کو کمرے کے درجہ حرارت پر دھوپ اور نمی سے محفوظ رکھیں۔

• تمام ادویات بچوں اور پالتو جانوروں سے دور رکھیں۔

• اگر دوا کے استعمال کی میعاد گزر چکی ہو تو اسے استعمال نہ کریں۔ یہ

• میعاد ڈبے پر درج ہوتی ہے۔

• اگر دوا استعمال نہ ہوئی ہو تو فارمیسی کو واپس کر دیں تاکہ اسے مناسب انداز

• میں تلف کر دیا جائے۔

• اپنی دوا کسی کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیں۔

اگر دوا کی خوراک کھانا بھول جائیں تو:

• جیسے ہی یاد آئے تو دوا کھالیں۔

• اگر اگلی خوراک کا وقت ہو گیا ہے تو پچھلی خوراک نہ کھائیں۔

مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی درج ذیل پر رابطہ کریں:

ڈرگ اینڈ پوائزن انفارمیشن سینٹر، ڈی پارٹمنٹ آف فارمیسی سروسز، آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

P. O. Box 3500, Stadium Road, Karachi-74800, Pakistan,

Tel: +92 21 3486 1504/1506, Email: drug.information@aku.edu, Website: hospitals.aku.edu/karachi/dpic



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi

