

Bevacizumab Eye Injection

Indications:

Bevacizumab is used in certain age-related eye disorders such as macular degeneration (AMD) and Diabetic retinopathy.

What is age-related macular degeneration (AMD)?

AMD is a disease associated with aging that gradually destroys sharp, central vision. Central vision is needed for seeing objects clearly and for common daily tasks such as reading and driving.

Symptoms of AMD:

- Distorted/blurred vision
- Vision loss
- Problem while driving and reading

How Bevacizumab works in AMD:

It stops the abnormal growth of blood vessels at the back of the eye (retina) and as a result stops the disease's progression.

Directions for use:

- It is only administered by a trained eye specialist.
- It is administered directly inside the eye.
- Start antibiotic eye drops one day before the injection as prescribed by the physician.
- Start oral antibiotic prior to the injection, if prescribed by the physician.

Tell your doctor if you:

- Are allergic to Bevacizumab
- Take any other prescription or non-prescription medicine

- Have diabetes mellitus
- Are pregnant, planning to become pregnant or breast-feeding

Common side effects:

- Temporary redness of the eye
- Pain in eye, usually mild and goes away within a day or two
- Burning sensation, lasting for a day
- Watering of eye
- Foggy vision
- Allergic reactions in some patients
- Itching

Consult your doctor immediately if:

- Pain or redness of eye worsens
- Continuous discharge from the eye
- Appearance or feeling of any unusual sign or symptom.

Precautions:

- Do not rub your eyes.
- You can take bath but avoid swimming for three days after the injection.

Storage:

- Store in refrigerator and do not freeze
- Keep all medicines away from children and pets
- Do not use medication beyond the expiry date mentioned on the pack
- If unused, return the drug to the pharmacy for proper disposal
- Do not share your medicine with anyone

For more information, please contact:

Drug and Poison Information Centre, Department of Pharmacy Services,
Aga Khan University Hospital, Karachi

P.O. Box 3500, Stadium Road, Karachi-74800, Pakistan.

Tel: 021 3486 1504/1506; Email: drug.information@aku.edu; Website: hospitals.aku.edu/karachi/dpic



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi

مریضوں کے لیے رہنما ہدایات بیواسیزومیب - آنکھوں کا انجیکشن

- اگر آپ کو ذیابیطس میلائٹس ہو۔
- اگر آپ حاملہ ہوں، حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں یا بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔

عمومی ضمنی اثرات

- آنکھ کی سرخی: جو عارضی ہوگی
- آنکھ میں درد: یہ عموماً معمولی ہوتا ہے اور ایک یا دو دن میں ختم ہو جاتا ہے
- جلن کا احساس: یہ ایک دن بعد ختم ہو جاتا ہے
- آنکھ سے پانی بہنا
- نظر کا دھندلانا
- الرجی: یہ مسئلہ چند مریضوں کے ساتھ ہو سکتا ہے
- آنکھ میں غارش

ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں اگر:

- آنکھ کے درد یا سرخی میں اضافہ ہو جائے
- آنکھ سے مائع کا مسلسل اخراج
- کوئی غیر معمولی علامت ظاہر ہو یا محسوس ہو

اعتیاد کی تدابیر

- آنکھوں کو رگڑنے سے گریز کریں۔
- آپ نہا سکتے ہیں تاہم انجیکشن لگوانے کے بعد تین دن تک تیرائی کرنے سے گریز کریں۔

انجیکشن محفوظ کرنے کا طریقہ

- فریج میں محفوظ کریں۔ فریج میں نہ رکھیں۔
- تمام ادویات بچوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
- پیک پر دی گئی انتہائی تاریخ استعمال کے بعد دو استعمال نہ کریں۔
- اگر استعمال نہ ہو تو انجیکشن فارمیسی کو واپس کر دیں تاکہ اسے مناسب انداز میں تلف کیا جاسکے۔
- اپنی ادویات کسی اور کو استعمال کے لیے نہ دیں۔

بیواسیزومیب آنکھوں کے علاج کے لیے دیا جانے والا انجیکشن ہے جو عموماً معمر افراد کو پردہ چشم کی خرابی (ایچ ریٹینڈ میکولر ڈی جینیئریشن۔ اے ایم ڈی) اور ذیابیطس کے باعث نظر کی خرابی (ڈیابیطک ریٹینوپتھی) جیسے امراض کے لیے دیا جاتا ہے۔

معمر افراد کے پردہ چشم کی خرابی (ایچ ریٹینڈ میکولر ڈی جینیئریشن) سے کیا مراد ہے؟
یہ آنکھوں کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو معمر افراد کو لاحق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ تیز نظر اور نظر مرکوز کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آنکھ کا مرکزی حصہ اشیا کو واضح طور پر دیکھنے اور روزمرہ افعال (مثلاً مطالعہ اور ڈرائیونگ) انجام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اے ایم ڈی کی علامات کیا ہیں؟

- نظر کا خراب ہونا / دھندلانا
- اندھا پن
- روزمرہ افعال مثلاً مطالعہ اور ڈرائیونگ کرنے میں مشکل

اے ایم ڈی کی صورت میں بیواسیزومیب کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
یہ آنکھ کے پچھلے حصے (قرنیہ) میں خون کی نالیوں کی غیر معمولی افزائش کو روک دیتی ہے جس کے نتیجے میں اس مرض میں اضافہ رک جاتا ہے۔

استعمال کی ہدایات

- صرف آنکھوں کا تربیت یافتہ ڈاکٹر بیواسیزومیب لگا سکتا ہے۔
- اسے براہ راست آنکھوں کے اندر لگایا جاتا ہے۔
- یہ انجیکشن لگوانے سے ایک دن قبل ڈاکٹر کے تجویز کردہ اینٹی بائیوٹک قطرے آنکھوں میں ڈالیں۔
- انجیکشن لگوانے سے ایک دن قبل اینٹی بائیوٹک ادویات (اگر ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں) کا استعمال بھی شروع کر دینا چاہیے۔

اگر مندرجہ ذیل میں سے کوئی صورت حال پیش آئے تو ڈاکٹر کو مطلع کریں:

- اگر آپ کو بیواسیزومیب سے الرجی ہو۔
- اگر آپ کوئی تجویز کردہ یا غیر تجویز کردہ استعمال کر رہے ہوں۔

مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی رابطہ کریں:

ڈرگ اینڈ پوائزن انفارمیشن سینٹر، ڈیپارٹمنٹ آف فارمیسی سروسز

آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

پی او بکس 13500 اسٹیڈیم روڈ، کراچی 74800 پاکستان

فون: +92 21 3486 1504/1506 ای میل: drug.information@aku.edu ویب سائٹ: hospitals.aku.edu/Karachi/dpic



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi