

مانع حمل / خاندانی منصوبہ بندی

معلومات برائے مریض / تیماردار



مانع حمل/خاندانی منصوبہ بندی کیا ہے؟

مانع حمل، جسے پیدائش پر قابو پانے (برتوکنڑوں) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حمل کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ افراد اور جوڑوں کو اپنے خاندان کی منصوبہ بندی کرنے اور تولیدی محنت سے متعلق باخبر فیصلے کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

مانع حمل/خاندانی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟

- غیر ضروری حمل کو روکتا ہے
- پچوں کی محنت مندوقدہ بندی میں مدد دیتا ہے
- حمل سے متعلق پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کرتا ہے
- افراد کو اپنی تولیدی محنت سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار دیتا ہے
- کچھ طریقے جنسی طور پر منتقل ہونے والے لفیکشنز (STIs) سے بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں

ٹویل مدتی مانع حمل طریقے

- انٹر ایور ائن ڈیوائس (IUD): رحم میں رکھا جانے والا ایک چھوٹا آہ، جو 5 سے 10 سال تک موثر رہتا ہے
- امپلانتس (Implants): جلد کے پیچے رکھا جانے والا ایک چھوٹا جراہ، جو ہماروں تبدیلیاں پیدا کر کے 3-5 سال تک موثر رہتا ہے

مستقل مانع حمل طریقے

- ٹوبل لاکیشن (خاتین کیس بندی): ایک جراحی عمل جس میں فلیوپین ٹیزز بند کردی جاتی ہیں
- ویسکیٹو می (مردوں کیس بندی): ایک چھوٹا جراہی عمل جس سے مرد کے مادہ تولید (پرم) کے خارج ہونے کو روکا جاتا ہے

ہنگامی مانع حمل طریقے

- ایر جنی مانع حمل گولیاں (ECPs): غیر محفوظ جنسی تعلق کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر لی جاسکتی ہیں
- کاپر IUD: غیر محفوظ جنسی تعلق کے 5 دن کے اندر رحم میں رکھا جاسکتا ہے تاکہ حمل کو روکا جاسکے

میرے لیے کون سا مانع حمل طریقہ بہتر ہے؟

اپنی عمر، محنت، بڑی زندگی اور تولیدی منصوبوں کو مد نظر رکھیں
کسی ماہر محنت سے مشورہ کریں تاکہ آپ کے لیے بہترین آپشن کا تعین کیا جاسکے

مانع حمل کے متعلق عام غلط فہمیاں

- غلط فہمی: مانع حمل با نجھپن (infertility) کا بہب بنتا ہے۔
- حقیقت: زیادہ تر مانع حمل طریقے واپس پلٹنے والے ہوتے ہیں اور مستقبل میں زنجیزی پر اثر نہیں ڈالتے۔
- غلط فہمی: کنڈو موم موثر نہیں ہوتا۔
- حقیقت: اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کنڈو حمل اور جنسی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں انتہائی موثر ہے۔
- غلط فہمی: IUD اصرف ان خواتین کے لیے ہے جو پہلے ہی ماں بن چکی ہیں۔
- حقیقت: IUD اہر عمر کی خواتین کے لیے محفوظ اور موثر ہے، چاہے وہ پہلے ماں بنی ہوں یا نہ بنی ہوں۔

مانع حمل/برتوکنڑوں کی اقسام

مانع حمل کے طریقے عمومی طور پر درج ذیل اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں:

- قیل مدتی (Short-Term)
- ٹویل مدتی (Long-Term)
- مستقل (Permanent)
- طریقے (Emergency)

قیل مدتی مانع حمل طریقے

- مانع حمل گولیاں (OCPs): روزانہ لی جاتی ہیں؛ درست استعمال پر موثر ہوتی ہیں
- انجیکشن (Injectables): ہر 1 سے 3 ماہ بعد لگایا جاتا ہے؛ موثر اور واپس پلٹنے والا طریقہ ہے
- مانع حمل پیچ (Patch): جلد پر چپکایا جاتا ہے اور ہفتہ وار تبدیل کیا جاتا ہے
- و جائیل رینگ (Vaginal Ring): اندازہ نہیاں میں تین ہفتے کی ہفتے کے لیے رکھا جاتا ہے
- مردانہ اور زنانہ کنڈو موم: حمل اور جنسی بیماریوں سے دو ہر احتفاظ فراہم کرتے ہیں

مانعِ حمل کہاں سے حاصل کریں؟

اپنے ڈاکٹر یا قربی محت مرکز سے رجوع کریں تاکہ آپ کی ضروریات کے مطابق بہترین مانعِ حمل طریقہ منتخب کیا جاسکے۔

مزید معلومات کے لیے:

اپنے ماہر محت سے مشورہ کریں اور اپنی تولیدی محت کے متعلق باخبر فصلے کریں۔

! آپ کی تولیدی محت، آپ کے ہاتھ میں

The Aga Khan University Hospital

📞 (021) 111-911-911

🌐 <https://hospitals.aku.edu/Pakistan>

📷 [akuhpakistan](#) | 📱 [AKUHPakistan](#) | 🎙 [@AKUHPakistan](#)

A Unit of The Aga Khan University Hospital and Medical College Foundation; Licensed under Section 42 of the Companies Ordinance 1984;
Registered Office: Stadium Road, P.O. Box 3500, Karachi 74800, Pakistan.