

Parent's Guideline after Circumcision



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi



نومولود کے ختنوں کے متعلق والدین کے لئے ہدایات



آغا خان یونیورسٹی ہسپتال، کراچی

The Aga Khan University Hospital, Karachi



Congratulations! Now your baby has been circumcised, follow the guidelines given below:-

Do's	Don'ts
<ul style="list-style-type: none">◆ Continue feeding your baby as you were doing before.◆ Baby can be bathed daily.◆ Clean the penile (Urinary) area with plenty of running luke warm water after every urination and use soap after every defecation.◆ Diaper the baby as before.◆ Give medication as advised by the doctor.◆ Do remember that the plastic ring usually falls off within 3 to 8 days. Sometimes, it may take 10 days.◆ Do remember that spots of blood and watery pinkish discharge after the first few hours of procedure may be observed.	<ul style="list-style-type: none">◆ Don't worry; your child may be little irritable for first few days.◆ Don't apply any dressing, powder, lotion, ointment or any home remedy on the ring.◆ Don't restrain the baby (don't tie the baby's legs) - Treat normally.◆ Don't try to pull out the ring; it will fall within the given time.

Note: -

Notify your doctor in CHC if

- a) Plastic ring has not fallen off in 10 days.
- b) Ring shifts back on to the shaft of the penis with swelling of the glans.
- c) Follow up is advised by the doctor.
- d) Penile swelling starts increasing after 3rd day.

If there is dribbling of blood from the plastic bell, blood clots or fresh blood stains seen in the diaper, bring the child to AKU Emergency-Room immediately.

Contact on: CHC 3493 0051 Ext: 1490 & 1492 Emergency Ext: 1090 & 1091



مبارک ہو آپ کے بچے کا ختم ہو چکا ہے۔ براہ مہربانی مندرجہ ذیل ہدایات غور سے پڑھیں۔

آپ کو نہیں کرنا:	آپ کو کرنا ہے:
<ul style="list-style-type: none"> ◆ اگر بچہ بے چین ہو تو پریشان نہ ہوں یہ صرف چند دنوں کی بات ہے۔ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ بچے کو حسب معمول دودھ پلاتے رہیں۔ ◆ بچے کو روزانہ نہلایا جاسکتا ہے۔
<ul style="list-style-type: none"> ◆ کوئی پاؤڈر، لوشن یا کریم ہرگز جھلے پر نہ لگائیں۔ ◆ بچے کا پاؤں ہرگز نہ باندھیں۔ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ پیشاب والی جگہ کو نیم گرم پانی سے دھوئیں خاص طور پر پیشاب کرنے کے بعد۔ پاخانہ صاف کر کے صابن اور گرم پانی سے دھوئیں
<ul style="list-style-type: none"> ◆ جھلے کو نکالنے کی کوشش ہرگز نہ کریں خود بخود اپنے وقت پر نکل جائے گا۔ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ آپ بچے کو ڈائپر پہنا سکتے ہیں۔ ◆ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائیں دیتے رہیں۔ ◆ پلاسٹک کا پھلّا عموماً ۳ سے ۸ دن میں گر جاتا ہے۔ ◆ کبھی کبھی دس دن بھی لگ جاتے ہیں۔
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ یاد رکھیں کہ نختے کے چند گھنٹوں کے بعد کچھ خون کے دھبے یا نشانات نظر آنا نارمل ہے۔

نوٹ کر لیں:

براہ مہربانی اپنے سی ایچ سی کے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں اگر:

- (۱) پلاسٹک کا پھلّا ۱۰ دن بعد خود بخود نہ گرے۔
- (۲) پھلّا اوپر جائے یا پیشاب کی جگہ سوجھ جائے۔
- (۳) ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق سی ایچ سی میں واپس آ کر دکھائیں۔
- (۴) پیشاب کی جگہ ۳ دن کے بعد سوجنا شروع ہو جائے۔

آپ فوراً اے کے یو کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ تشریف لائیں اگر:

پلاسٹک تیل سے خون آنے لگے۔ خون کے لوتھڑے یا تازہ خون ڈائپر پر لگا ہوا ہو۔

رابطہ کریں: سی ایچ سی 0051 3493 ایکسٹینشن: 1490 اور 1492 ایمرجنسی ایکسٹینشن: 1090 اور 1091

